

POLVERE PER SOLUZIONE ORALE MACROGOL 4000

Legga attentamente questo foglio, poiché contiene informazioni importanti, di cui si deve tenere conto prima di usare questo prodotto.

Se ha qualsiasi dubbio o ulteriori domande, si rivolga al medico o al farmacista.

Isypan® Regolaq è un dispositivo medico contenente macrogol 4000, un lassativo ad azione osmotica.

Isypan® Regolaq è disponibile in pratiche bustine predosate da 10 g, da sciogliere nella bevanda preferita.

Conservi questo foglio per poterlo consultare all'occorrenza.

Contenuto di questo foglio:

1. CHE COS'È ISYPAN® REGOLAQ E A CHE COSA SERVE
2. COSA CONTIENE ISYPAN® REGOLAQ
3. PRIMA DI PRENDERE ISYPAN® REGOLAQ
4. COME UTILIZZARE ISYPAN® REGOLAQ
5. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
6. COME CONSERVARE ISYPAN® REGOLAQ
7. ULTERIORI INFORMAZIONI

CHE COS'È ISYPAN® REGOLAQ E A CHE COSA SERVE

Isypan® Regolaq ha una elevata capacità di reidratare e ammorbidire le feci dure, facilitandone l'evacuazione e dando una sensazione di sollievo.

Isypan® Regolaq ha un meccanismo di azione fisico e svolge la sua azione in maniera delicata: non viene assorbito dall'organismo, viene eliminato in forma non modificata e non dà origine alla produzione di gas.

Può essere assunto nel caso di intestino occasionalmente irregolare ed è particolarmente indicato nella stitichezza cronica.

È adatto ai bambini a partire dai 2 anni, anziani e celiaci.

Isypan® Regolaq non contiene aromi, zucchero o glutine e non contiene elettroliti.

La sua funzione regolarizzante viene favorita da uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione, ricca in fibre, frutta e verdura, con un'adeguata assunzione di liquidi e una buona attività fisica.

COSA CONTIENE ISYPAN® REGOLAQ

Macrogol 4000.

Non contiene elettroliti.

Non contiene eccipienti né edulcoranti, aromi o zuccheri.

Non contiene conservanti.

Non contiene glutine.

PRIMA DI PRENDERE ISYPAN® REGOLAQ

Controindicazioni

Non prenda **Isypan® Regolaq** in caso di:

- ipersensibilità al macrogol 4000;
- perforazione e/o ostruzione gastrointestinale.

Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista prima di prendere **Isypan® Regolaq**.

COME UTILIZZARE ISYPAN® REGOLAQ

Isypan® Regolaq può essere usato a partire da 2 anni di età.

Isypan® Regolaq manifesta la sua efficacia dopo le 48 ore dalla sua assunzione e può essere utilizzato per trattamenti di durata massima pari a 30 giorni.

La sua formulazione contenente solo macrogol 4000 lo rende adatto a pazienti che necessitano un regime alimentare a basso contenuto di sodio, privo di galattosio e senza glutine.

Va diluito con una bevanda a piacere, fredda o calda (circa 150 ml): per esempio un bicchiere d'acqua, un succo di frutta, del tè o anche del latte mescolando fino ad ottenere una soluzione omogenea.

L'assenza di aromatizzanti ed edulcoranti non altera il sapore della bevanda.

Bere la soluzione così ricostituita.

Il prodotto è monouso, non utilizzare le bustine in modo parziale o già aperte.

Non utilizzare il dispositivo in un modo diverso da quello indicato dal produttore.

Adulti:

La dose appropriata è quella minima sufficiente a produrre la regolare evacuazione di feci morbide e deve essere adattata in base agli effetti osservati. Varia da 1 bustina a giorni alterni (in particolare per uso pediatrico) fino a 2 bustine al giorno.

Quando viene raggiunta una defecazione regolare, il dosaggio deve essere ridotto a 1 bustina al giorno o a giorni alterni.

La dose massima giornaliera può arrivare a 20g e può essere assunta in un'unica somministrazione.

Non superare la dose massima giornaliera di 20g.

Bambini:

Per pazienti a partire dai 2 anni, la dose raccomandata è 0,7g/kg.

Fino a 20 Kg di peso, il dosaggio va commisurato al peso corporeo in base alle indicazioni del medico.

Donne in gravidanza o in allattamento:

Non esistono studi adeguati e ben controllati, pertanto non assumere **Isypan® Regolaq** durante la gravidanza e/o l'allattamento.

Assunzione di Isypan® Regolaq con altri prodotti

Non assumere **Isypan® Regolaq** in concomitanza con farmaci per via orale.

Se prende più Isypan® Regolaq di quanto deve

Dosi eccessive di **Isypan® Regolaq** possono provocare diarrea, dolore addominale, distensione addominale e vomito, che si risolvono quando si interrompe il trattamento o si riduce la dose.

In queste circostanze, si deve contattare il medico.

Se dimentica di prendere Isypan® Regolaq

Non prenda una dose doppia di **Isypan® Regolaq** per compensare la dimenticanza della dose.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Gli effetti indesiderati sono risultati generalmente lievi e transitori.

Effetti indesiderati riscontrati negli adulti e nei bambini:

Diarrea, dolore addominale, distensione addominale, nausea, vomito, incontinenza fecale e flatulenza.

Casi rari di reazioni allergiche, in questo caso sospendere l'uso del prodotto ed informare il proprio medico o farmacista.

In caso di diarrea, che generalmente scompare quando si sospende il trattamento o si riduce la dose, può essere opportuno contattare il medico.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

COME CONSERVARE ISYPAN® REGOLAQ

Il Dispositivo medico va conservato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare la confezione originale in luogo fresco ed asciutto.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto nella confezione integra e correttamente conservata.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale.

Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.



Lamp San Prospero S.p.A.
Via della Pace 25/A
41030 San Prospero s/S (MO)

Distribuito da:

Pharm@idea S.r.l.

Via del Commercio 5,
25039 Travagliato (BS)

